

# Extrait

## Notations

Pour tout  $(p, q) \in \mathbb{N}^{*2}$ , on note  $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$  l'espace vectoriel des matrices à coefficients réels, à  $p$  lignes et  $q$  colonnes ; si  $M \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ ,  ${}^tM$  désigne la matrice transposée de  $M$  et  $\text{rg}(M)$  son rang.

Pour tout entier naturel  $k$ ,  $\mathcal{P}_k$  désigne l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels et de degré  $\leq k$ .

Dans ce problème,  $n$  désigne un entier naturel non nul et  $x_0, x_1, \dots, x_n$  des réels **deux à deux distincts** ; on note  $\pi$  le polynôme  $\pi = (X - x_0)(X - x_1) \cdots (X - x_n)$ .

Enfin, pour tout entier naturel  $m$ , on définit l'application

$$\begin{aligned} f_m : \mathcal{P}_m &\longrightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ P &\longmapsto (P(x_0), \dots, P(x_n)) \end{aligned}$$

## 1<sup>ère</sup> Partie : Étude de l'application $f_m$

Soit  $m$  un entier naturel.

1. Si  $R \in \mathcal{P}_n$  est tel que pour tout  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $R(x_i) = 0$ , montrer que  $R$  est le polynôme nul.
2. Vérifier que  $f_m$  est une application linéaire.
3. Dans cette question, on suppose que  $m \geq n + 1$ .
  - (a) Montrer que  $\text{Ker } f_m = \{Q\pi ; Q \in \mathcal{P}_{m-n-1}\}$ .
  - (b) Montrer que les sous-espaces vectoriels  $\text{Ker } f_m$  et  $\mathcal{P}_n$  sont supplémentaires dans  $\mathcal{P}_m$ .
  - (c) En déduire la dimension de  $\text{Ker } f_m$  puis en donner une base.
  - (d) Déterminer le rang de  $f_m$  ; l'application  $f_m$  est-elle surjective ?
4. Dans cette question, on suppose que  $m \leq n$ .
  - (a) Montrer que  $f_m$  est injective.
  - (b) Quel est le noyau de  $f_m$  ? Quel est son rang ?
  - (c) À quelle condition sur les entiers  $n$  et  $m$  l'application  $f_m$  est-elle surjective ?
5. On définit les polynômes  $L_0, L_1, \dots, L_n$  par  $L_i = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{(X - x_j)}{(x_i - x_j)}$ ,  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ .
  - (a) Pour  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ , quel est le degré de  $L_i$  ? Vérifier que pour tout  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ ,  $L_i(x_k) = \delta_{i,k}$  avec  $\delta_{i,k} = 1$  si  $i = k$  et 0 sinon.
  - (b) Calculer  $f_n(L_i)$ ,  $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ . Que représente la famille  $(f_n(L_0), f_n(L_1), \dots, f_n(L_n))$  pour l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^{n+1}$  ?
  - (c) Montrer que la famille  $(L_0, L_1, \dots, L_n)$  est une base de  $\mathcal{P}_n$ .
  - (d) Soit  $y = (y_0, y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ .
    - i. Montrer qu'il existe un unique polynôme  $P_y \in \mathcal{P}_n$  tel que  $f_n(P_y) = (y_0, y_1, \dots, y_n)$ .
    - ii. Exprimer le polynôme  $P_y$  en fonction de  $L_0, L_1, \dots, L_n$  et  $y_0, y_1, \dots, y_n$ .

## 2<sup>ème</sup> Partie : Approximation polynômiale au sens des moindres carrés

On considère des réels  $y_0, y_1, \dots, y_n$  qui sont respectivement les images des réels  $x_0, x_1, \dots, x_n$  par une fonction  $\varphi$ , et on cherche à déterminer les polynômes  $P \in \mathcal{P}_m$  tels que la quantité

$$\Phi_m(P) = \sum_{i=0}^n (y_i - P(x_i))^2$$

soit minimale, et à préciser la valeur minimale  $\lambda_m$  de la dite quantité.

On parle alors d'approximation polynômiale au sens des moindres carrés de la fonction  $\varphi$  aux points  $x_0, x_1, \dots, x_n$ ; ce type d'approximation est particulièrement utilisé dans les problèmes d'optimisation et de contrôle de qualité.

### A. Étude dans le cas $m \geq n + 1$

1. Donner un polynôme  $Q_0 \in \mathcal{P}_m$  tel que  $f_m(Q_0) = (y_0, y_1, \dots, y_n)$ . Que vaut  $\Phi_m(Q_0)$  ?
2. En déduire la valeur minimale  $\lambda_m$  de  $\Phi_m(P)$  lorsque  $P$  décrit  $\mathcal{P}_m$ , et préciser à l'aide de  $Q_0$  et  $\text{Ker } f_m$  l'ensemble des polynômes en lesquels cette valeur minimale est atteinte.

### B. Étude dans le cas $m \leq n$

Dans cette section, on pose

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & \cdots & x_0^m \\ 1 & x_1 & \cdots & x_1^m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1, m+1}(\mathbb{R}), \quad b = \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n+1, 1}(\mathbb{R}).$$

1. Montrer que si  $M, N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$  alors  ${}^t(M + N) = {}^tM + {}^tN$  et que, si  $M' \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$  et  $N' \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{R})$ , alors  ${}^t(M'N') = {}^tN' {}^tM'$ ;  $p, q$  et  $r$  étant des entiers naturels non nuls.

2. Soit  $v = \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m+1, 1}(\mathbb{R})$ ; on lui associe le polynôme  $P_v \in \mathcal{P}_m$  défini par  $P_v(x) = \sum_{k=0}^m v_k x^k$ .

- (a) Calculer le produit  $Av$  et l'exprimer à l'aide des valeurs prises par  $P_v$  aux points  $x_0, x_1, \dots, x_n$ .
- (b) Montrer alors que si  $Av = 0$  alors  $v = 0$ .

Fin extrait